

RAPPORT FRA TAKSERING AV RYPER I ØRVILLDALEN - VINGELEN 2009

Takseringen ble gjennomført 15. og 16. august 2009

Ansvarlig: Per Østigård
Antall taksører 10
Antall hunder 13
Antall linjer 7
Linjemeter taksert 28 000

Værforholdene under takseringen vurderes, begge dager sett under ett, som middels gunstige med tanke på hundenes arbeidsforhold.


Rypetellinga ble preget av særdeles få observasjoner samt svært få og små kull. Største kull hadde 7 kyllinger. Snittstørrelsen på kullene ligger på 3 kyllinger. Enslige voksne utgjorde et stort innslag, men også stamfuglbestanden er liten sammenlignet med tidligere år. Det ble ikke observert vesentlig innslag av omlagte kull med "pipkyllinger".

Det ble ikke observert mus og kun 2 lemen.

Det ble ikke observert rovfugl bortsett fra 1 kongeørn. Fraværet av rovfugl er trolig en følge av svikten i smågnagerbestanden.

År	Antall observasjoner	Antall voksne	Antall kyllinger	Antall ryper	Ryper pr. taksert 1000 m	Ryper pr. km ²	Kyllinger pr. voksent par
2002	37	46	133	179	6,3	36	5,8
2003	74	94	232	326	11,5	68	4,9
2004	93	121	335	456	16,3	89	5,5
2005	104	130	361	491	17,5	86	5,6
2006	61	88	275	363	13,0	60	6,3
2007	95	140	581	721	25,8	152	8,3
2008	99	149	357	506	18,1	79	4,8
2009	34	57	67	124	4,4	*	2,4

*Ryper pr. km² blir beregnet av høgskolen på Evenstad via dataprogrammet "Distance sampling". Resultatet fra denne beregningen foreligger ikke ennå.



Taksørenes vurdering:

Tabellen over de 8 årene det er foretatt rypetaksering i Ørvilldalen viser at de årlige svingningene er store. Området har i norsk sammenheng gjennomgående hatt en svært god bestand av liryper.

Årets kyllingproduksjon med 2,4 kyllinger pr. voksent par er det desidert dårligste i 8-årsperioden og viser med all tydelighet at vi står ovenfor et krakk i produksjonen. Det er også betenkelig at stamfuglbestanden er mindre enn forventet.

Det er trolig sammensatte årsaker til den særdeles lave kyllingproduksjonen. Tilnærmet fullstendig fravær av smågnagere har resultert i høyt predasjonstrykk fra rovdyr. Været var ikke optimalt verken før eller på klekkingstidspunktet. Dette kan ha hatt en viss innvirkning, men er vanskelig å dokumentere. Svikten i stamfuglbestanden er vanskelig å forklare.

2009 må antas å være et bunnår der det er særdeles viktig å forvalte den resterende rypepopulasjonen med varsomhet slik at langvarig svikt forebygges.

17. august 2009

Per Østigård